

PREPARAZIONE DOMICILIARE PER MEZZO DI CONTRASTO IODATO

(utile dallo stadio 3° K/DOQI (GFR < a 60 ml/min).

UTILE TENERE ACIDO URICO SOTTO 7 MG/DL CONTROLLO FUNZIONE RENALE DOPO 72 ORE DALL'ESAME

- 1) Da 2-3 giorni prima dell'esame: 1 litro di acqua con 1 busta idrolitina (o citrosodina 3 cucchiaini al giorno)
- 2) Farmaci da sospendere 4 giorni prima dell'esame: Metformina, sartani, Ace I .) Sartani e ace I sostituibili con Ca antagonisti), diuretici tiazidici
- 3) Dal giorno prima fino al giorno dopo l'esame assumere
 - N-AcetilCisteina (NAC) 1200 mg. (due bustine) mattino + 1200 mg. (due bustine) la sera fino al giorno successivo all'esame
- 4) Ricontrollare creatinina dopo 3 giorni dall'esame.

Preparazione per GADOLINIO in pz con IRC

- Il giorno dell'esame ed il giorno successivo assumere N-AcetilCisteina (NAC) 1200 mg. (due bustine) mattino + 1200 mg. (due bustine) la sera, inoltre bere 1 litro di acqua con 1 busta di idrolitina

Allergia MEZZO DI CONTRASTO TAC e RM

In caso di precedente allergia a mezzo iodato o presenza di situazioni di rischio allergico:

Preparazione per mezzo di contrasto iodato, tac:

- Deltacortene 25 cp (una / due cp 14 ore , 7 ore , 1 ora prima esame, Trimeton fiale al mattino dell'esame